

## รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) โรงพยาบาลท่าชนะ

รายงานผลการประเมินการสั่งใช้ยา Ceftazidime injection ช่วงเวลา 9 กันยายน 2566 – 24 มีนาคม 2567

จำนวนผู้ป่วย 41 ราย ผู้ป่วยนอก 3 ราย ผู้ป่วยใน 38 ราย

ใช้ยาดังกล่าว จำนวน 944 vials มูลค่า 18,181.44 บาท

ได้รับแบบประเมินการสั่งใช้ยา (DUE form) จำนวน 33 ราย (80.49 %)

ไม่ได้รับแบบประเมินฯ จำนวน 8 ราย ผู้ป่วย 8 รายดังกล่าว มีเหตุผลในการใช้ยารายการนี้ ดังนี้

1. ฉีดยาเดิมต่อจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ตามบันทึกข้อความส่งตัวกลับให้ฉีดยาต่อจนครบระยะ)  
จำนวน 2 ราย
2. ฉีดยา STAT 1 dose ขณะเตรียมส่งตัวผู้ป่วยตามคำแนะนำของแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย
3. ผสมยาในน้ำยาล้างไต 2 ราย (ตรงตาม ข้อบ่งใช้ที่กำหนด)
4. เปลี่ยนยาปฏิชีวนะ จาก Ceftriazone ใช้นาน 5 วัน อาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้น 1 ราย (CA bladder S/P surgery)
5. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Ceftriazone 1 ราย

ประเมินความสมบูรณ์ของแบบประเมินการสั่งใช้ยา (DUE form) จำนวน 33 ใบ

- ระบุข้อบ่งใช้ตรงตามที่กำหนดไว้ 29 ใบ (87.88 %)

1. Empiric therapy สำหรับการติดเชื้อ P.aeruginosa และ meliodosis	19 ใบ
2. Specific therapy สำหรับการติดเชื้อ P.aeruginosa และ meliodosis	1 ใบ
3. Sepsis ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม DM/CKD/Cirrhosis/Thalassemia	5 ใบ
4. Infected CAPD	3 ใบ
5. ข้อ 1 และ ข้อ 3	1 ใบ

- ระบุข้อบ่งใช้นอกเหนือที่ระบุไว้ในแบบประเมินฯ 4 ใบ

1. มีประวัติ Multiple drug resistance (MDR)	2 ใบ
2. E.coli UTI with Septicemia U/D HT,DLP,DM,COPD, CKD	1 ใบ
3. แพ้ ceftriazone มีประวัติใช้ Ceftazidime ได้	1 ใบ

ข้อเสนอแนะ

1. นำเข้าประชุม PTC เพื่อพิจารณาเรื่องข้อบ่งใช้ที่เหมาะสมเพิ่มเติม